

Melanom Nachsorge, Nachkontrollschema, Ärzteversion (DER)

Änderungshinweis: Aktualisiert per Juni 2024

Low-risk: Stadium IA (pT1a, Breslow <0.8mm)

Intermediate-risk: IB-IIA

Adaptiertes IR: Stadium IIIA/IIIB 8.Auflage (pT1-2a) Sentinel <1mm Tumorlast) *

High-risk: Stadium IIB, IIC, Stadium IIIB – IIID

Adjuvante Therapie: prüfen ab Stadium IIIA, wenn Tumorlast im Sentinel >1mm (Daten dazu für Dabrafenib/Trametinib, Pembrolizumab). 1x jährlich MRI Schädel empfohlen

Beim Therapiestopp St. IV: Nachkontrolle entsprechend separatem Schema

Jahre Monate nach Operation oder Metastasen		Low-Risk	Intermediate-Risk	High-Risk	Adjuvante Therapie	Datum der Untersuchung	Therapie
Eingangsstaging		A B, D: ab 0.6mm	A, B, D	A, B, C, D	C,D		
1	3		A	A	A, C, D		
	6	A	A, (B)	A, C, D	A,C, D		
	9		A	A	A,C, D		
	12	A	A, B, D	A, C, D	A, C, D (Ende adjuvante Therapie)		
2	15		A	A	A, C, D		
	18	A	A, (B)	A, C, D	A, C, D		
	21		A	A	A, C,D		
	24	A	A, B, D	A, C, D	A, C, D		
3	27		A	A	A		
	30	A	A, (B)	A, C, D	A, C, D		
	33		A	A	A		
	36	A	A, B, D	A, C, D	A, C, D		
4	39				A		
	42		A	A, B	A, C, D		
	45				A		
	48	A	A, B, D	A, C, D	A, C, D		

Jahre Monate nach Operation oder Metastasen		Low-Risk	Intermediate-Risk	High-Risk	Adjuvante Therapie	Datum der Untersuchung	Therapie
5	51				A		
	54		A	A, B	A, B, D		
	57				A		
	60	A	A, B, D	A, C, D	A, C, D		
6	63						
	66				A, B, D		
	69						
	72	A	A	A, D	A, C, D		
7	75						
	78						
	81						
	84	A	A	A, D	A, D		
8	87						
	90						
	93						
	96	A	A	A, D	A, D		
9	99						
	102						
	105						
	108	A	A	A, D	A, D		
10	111						
	114						
	117						
	120	A	A	A, D	A, D weitere jährliche dermatologisc he Kontrollen empfohlen		

A: Komplette Untersuchung der äusseren Haut einschliesslich Dermatoskopie von Nävuszellnävi. Palpation der Region des Primärtumors, der Lymphknotenregionen. * (A) Bei wenigen Naevi (<30) Kontrolle 1x1 jährlich ausreichend

B: Sonographie locoregionäre Lymphknoten (Adaptiertes intermediate risk)

C: PET-Untersuchung evtl. MRI ZNS

D: S-100 (Blutuntersuchung)