



MASKEN HALTEN VIRENHALTIGE TRÖPFCHEN SEHR GUT ZURÜCK!

Tröpfchen haben eine Masse und fliegen geradeaus, während die Luft einen Bogen macht.





ANSTECKUNGSWEGE


Viren können in **Mund, Nase, und Augen** auf die Schleimhäute des Atemapparates gelangen.



VIRENHALTIGE TRÖPFCHEN HABEN EINE MASSE UND FALLEN ZU BODEN.



ÜBERTRAGUNGSWEGE UND PRÄVENTIONSMASSNAHMEN



Ansteckung

Symptombeginn

V 02 - 23.10.20



Zeit

LATENZ mit Virusvermehrung

im Mittel 5-6 Tage

SYMPTOME

Symptome können fehlen, sehr leicht ausgeprägt sein oder auch über eine lange Zeit bestehen.

INFEKTIOSITÄT

1-2 Tage vor Symptombeginn

Die **Infektiosität** fängt circa 2 Tage vor Symptombeginn an und besteht im Normalfall für mehrere Tage.

PCR POSITIV Nasenrachenabstrich

Die **PCR** kann sehr lange positiv sein oder auch fälschlicherweise negativ.

SEROLOGIE im Blut



**INFEKTIONSPRÄVENTION
& SPITALHYGIENE**