



Hämatologie

Rechnung an:

☐ Patient ☐ Auftraggeber ☐ Drittzahler

Abnahme-Datum

TTMMJJJJ

Abnahme-Zeit

HHMM

Name:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Strasse:

PLZ/Ort:

Externe Referenznummer

Patienten-Etikette oder Patienten-Angaben

☐ Befundkopie an:

Nachbestellung von Auftragsformularen

☐ 25 Stück

☐ 50 Stück

☐ 100 Stück

Material (für jedes Material ein separates Formular verwenden)

☐ Peripherblut

☐ Aszites

☐ Liquor

☐ Stammzell-Sammlung

☐ Pleuraerguss

☐ Bronchiallavage

☐ Donorlymphozyten

☐ Anderes

Vacutainer **violett**
(EDTA)

Vacutainer **rot**
(Serum)

Vacutainer **weinrot**
(Thrombo-Exact)

Vacutainer **grün**
(Heparin)

Vacutainer **blau**
(Citrat)

Frischmaterial
(Nativ)

Markierung



Richtig ☐

Falsch ☐

Einsendercode
Auftraggeber

BLUTBILD

- ☐ Blutbild, Automat (Hämatogramm II)
☐ Blutbild mit automatischer Differenzierung (Hämatogramm V)
☐ Blutbilddifferenzierung (mikroskopisch)

Fragestellung: _____

- ☐ Retikulozytenbestimmung
☐ Malaria-Abklärung
☐ Abklärung-EDTA-Pseudo-Thrombozytopenie
☐ HbF in Erythrozyten (Kleihauer)
☐ Donorlymphozyten

HÄMATOLOGISCHE ZYTOLOGIE

- ☐ Zellzahl + Zytologie Liquor
☐ Zellzahl Punktat inkl. Zytologie
☐ Eisenfärbung

SPEZIALUNTERSUCHUNGEN

- ☐ Elastase (Neutrophile) ①
☐ Thrombopoietin ①
☐ VEGF A (Vascular Endothelial Growth Factor) ①
☐ sBCMA (soluble B-Cell maturation antigen) ①

SYNOVIALFLÜSSIGKEIT

Klin. Diagnose _____

Punktion/Gelenk _____

Menge _____ml

Steroide intraartikulär letztmalig _____

Farbe ☐ hellgelb ☐ blutig
☐ gelb ☐ weiss-grau
Trübung ☐ klar ☐ leicht
☐ mittel ☐ stark

- ☐ Zellzahl
☐ Harnsäurekristalle / Ca-Pyrophosphate
☐ Hydroxyapatit

① Nicht im akkreditierten Bereich

Informationen zu den Analysen finden Sie unter: <http://vademecum.usz.ch>

Bitte
jedes
Röhrchen
nach
Blutentnahme
5 mal
sorgfältig
kippen!

Labornummer



010060310063

Klinische Angaben / Bemerkungen

Antikoagulation: ☐ Nein ☐ Ja, Präperat + Dosierung: _____
☐ Stunden seit letzter Dosierung: _____

Wichtige Hinweise

- Pro 3 Parameter 1 Citratröhrchen oder Aliquot à 1ml Citratplasma (falls nicht anders spezifiziert).
- Vollblut/Plasma muss bei Raumtemperatur innerhalb von 4h im Labor eintreffen.
- Alternativ Plasma in mehrere Röhrchen aliquotieren, schockgefrieren und Versand auf Trockeneis.

Vacutainer **violett**
(EDTA)

Vacutainer **blau**
(Citrat)

Vacutainer **rot**
(Serum)

Vacutainer **grün**
(Heparin)

Globaltests / Fibrinolyse

- ☐ Quick/INR ①
- ☐ aPTT ①
- ☐ Thrombinzeit (TZ) ①
- ☐ Reptilasezeit
- ☐ Fibrin-D-Dimere ①

Einzelfaktoren

- ☐ Fibrinogen (fkt.) ①
- ☐ Fibrinogen (ag.)
- ☐ Faktor 2 (II, fkt.)
- ☐ Faktor 5 (V, fkt.) ①
- ☐ Faktor 7 (VII, fkt.)
- ☐ Faktor 8 (VIII, fkt.) ②
- ☐ Faktor 9 (IX, fkt.) ②
- ☐ Faktor 10 (X, fkt.)
- ☐ Faktor 11 (XI, fkt.)
- ☐ Faktor 12 (XII, fkt.)
- ☐ Faktor 13 (XIII, fkt.) ①
- ☐ von Willebrand Faktor (vWF, fkt.) ②
- ☐ von Willebrand Faktor (vWF, ag.)
- ☐ ADAMTS13 (fkt.) ②

Gerinnungsfaktoren-Inhibitoren

- ☐ Antithrombin (fkt. / chromogen) ①
- ☐ APC-Resistenz
- ☐ Protein C (fkt.)
- ☐ Protein S, freies (ag.)

Antiphospholipid-Antikörper

- ☐ Lupus-Antikoagulans (DRVVT + LA aPTT)
- ☐ Lupus-Antikoagulans (DRVVT)
- ☐ Lupus-Antikoagulans (LA aPTT)

Erworbene Hemmkörper

- ☐ Faktor 8 (VIII)-Hemmkörpertest ② ⑥
- ☐ Faktor 9 (IX)-Hemmkörpertest ② ⑥

Antikoagulantien

- ☐ anti-F2a (IIa)-Akt. Argatroban ①
- ☐ anti-F2a (IIa)-Akt. Bivalirudin ①
- ☐ anti-F2a (IIa)-Akt. Dabigatran ②
- ☐ anti-F10a (Xa)-Akt. Apixaban ①
- ☐ anti-F10a (Xa)-Akt. Edoxaban ①
- ☐ anti-F10a (Xa)-Akt. Rivaroxaban ①
- ☐ anti-F10a (Xa)-Akt. LMWH ① ⑦
- ☐ anti-F10a (Xa)-Akt. UFH ① ⑦
- ☐ anti-F10a (Xa)-Akt. Fondaparinux ① ⑦
- ☐ anti-F10a (Xa)-Akt. Danaparoid ② ⑦

Fibrinolyse-Parameter

- ☐ Alpha-2-Antiplasmin (fkt.)
- ☐ Plasminogen (fkt.)

Spezialparameter

- ☐ Antithrombin (ag.)
- ☐ Faktor 8 (VIII, chromogen)
- ☐ Faktor 8 (VIII, ag.) ④ ⑩
- ☐ Emicizumab-Konzentration
- ☐ Faktor 8 (VIII, chromogen unter Emicizumab)
- ☐ Faktor 8 (VIII, fkt. Efanesoctocog) ⑩
- ☐ Faktor 8 (VIII, chrom. Efanesoctocog) ⑩
- ☐ Faktor 8 (VIII)/vWF Bindungskapazität (vWS Typ 2N) ⑨ ⑩
- ☐ Faktor 9 (IX, chromogen)
- ☐ Protein S (fkt.) ④
- ☐ vWF Propeptid (ag.) ④ ⑩

Thrombingeneration-Assay

- ☐ Bleedscreen ⑩
- ☐ Thromboscreen ⑩

- ☐ **Gerinnungsstatus** ①
Quick/INR, aPTT, Thrombinzeit, Fibrinogen
- ☐ **Tiefer Spontan-Quick** (10ml Citratblut)
Gerinnungsstatus, F2 (II), F5 (V), F7 (VII), F9 (IX), F10 (X)
- ☐ **Thrombophilie-Screening** (10ml Citratblut. 1x EDTA)
Gerinnungsstatus, D-Dimere, F8 (VIII), Protein C, freies Protein S, Antithrombin, APC-Resistenz, LA (DRVVT + LA aPTT), Prothrombin (G20210A), F5 (V)-Leiden-Mutation ⑤
- ☐ **Blutungsneigung-Screening** (10ml Citratblut)
Gerinnungsstatus, F8 (VIII), F9 (IX), F11 (XI), F13 (XIII), vWF (fkt.), vWF (ag.), Alpha-2-Antiplasmin (fkt.)

Molekulare Diagnostik

- ☐ Faktor 5 (V)-Leiden (R506Q) + Prothrombin (G20210A) ⑤

Thrombozyten-Funktionstests

- ☐ PFA (6ml Citratblut) ② ③ ⑥
- ☐ Multiplate (6ml Hirudinblut) ② ③ ⑥
- ☐ PRP-Aggregometrie (30ml Citratblut) ③ ⑥

Thrombozyten-Antikörper

- ☐ HIT-Antikörper-Suchtest (IgG) ②

① Jederzeit erhältlich.
 ② Notfallanalyse nur nach Rücksprache mit Dienstarzt Hämatologie.
 ③ Nach vorgängiger Anmeldung unter Tel. 044 255 22 06.
 ④ Spezialindikationen. Durchführung monatlich bis quartalsweise.
 ⑤ Schriftliche Einwilligungserklärung muss bei Auftraggeber vorliegen.
 ⑥ Verwendung von S-Monovetten® (Sarstedt) empfohlen.

⑦ Zielwerte statt Normwerte; bei s.c.-Injektion Bestimmung des Spitzenspiegels, d.h. Blutentnahme 3-4 Stunden nach Injektion.
 ⑧ Zusätzlich F8 (VIII) bzw. F9 (IX) erforderlich; falls nicht vorhanden, erfolgt die ergänzende Messung.
 ⑨ Zusätzlich vWF ag. erforderlich; falls nicht vorhanden, erfolgt die ergänzende Messung.
 ⑩ Nicht im akkreditierten Bereich

